

- भोलकुरा वा खानेकुरा खान नसकेमा ।
- आमाको दूध चुस्न नसकेमा ।

रूघाखोकी र निमोनिया लाग्न नदिने उपायहरू

- बच्चालाई धुवाँ, धुलो, मट्टितेलको खारबाट जोगाउनु पर्दछ
- भान्सा भएको कोठामा राख्नु हुँदैन ।
- बच्चाको नजिक धुम्रपान गर्नु हुँदैन ।
- मौसमअनुसारको कपडा लगाइदिनु पर्दछ ।
- न्यानो तर हावा आउन जान सक्ने कोठामा राख्नुपर्दछ ।
- एक वर्षभित्रै सम्पूर्ण खोपको मात्रा पूरा गराउनु पर्दछ ।
- जन्मेदेखि ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन पर्छ ।
- ६ महिनापछि बच्चालाई आमाको दूधका साथै थप पोषिलो र ताजा खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ ।
- धूलो र फोहोर वातावरणमा खेल्न दिनु हुँदैन ।
- बच्चाको जन्मान्तर कम्तीमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षको हुनु पर्दछ ।

निमोनिया (PNEUMONIA)



रूघाखोकी लागेको बखत बच्चालाई न्यानो पारी राख्ने, आमाको दुध धेरै पटक खुवाउने, नाक सफा राख्ने लगायतका घरेलु उपचार गर्नु पर्छ । निमोनियाको लक्षण देखिएमा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्छ ।



निमोनिया भएमा तुरुन्त औषधिबाट उपचार गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा निमोनियाबाट हुने मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । तर साधारण रूघाखोकीमा भने औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन । औषधि प्रयोग गर्नाले पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा नराम्रो असर पर्न सक्छ ।

आम्दा-नेपाल

पो.ब.नं.: ८९०९, जोरपाटी-४, काठमाडौं
फोन नं.: (+९७७-९)-४९९०२३५/४९९९९४०
फ्याक्स: (+९७७-९)-४९९९९४९
इ-मेल: amda@healthnet.org.np
www.amda.org.np



परिचय

आँखाले नदेखिने कीटाणुबाट अचानक श्वासप्रश्वास प्रक्रियासँग सम्बन्धित फोक्सो र त्यसका सहायक अंगहरूमा संक्रमण भई सास फेर्न गाह्रो भएमा यसलाई आकस्मिक श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग भनिन्छ । यसले धेरैजसो फोक्सो र त्यसका अन्य भागहरूमा असर गर्दछ । कहिलेकाहीं कानमा समेत असर गर्दछ ।

रोगको लक्षण

श्वासप्रश्वास रोगमा प्रायजसो बच्चाहरूलाई साधारण रूघाखोकी लाग्ने गर्दछ । तर, कहिलेकाहीं रूघाखोकीबाट नै ५ वर्षमुनिका बच्चाहरूमा निमोनिया भई घातक समेत हुन सक्दछ । फोक्सोमा कीटाणुहरूबाट संक्रमण भएमा निमोनिया हुन्छ । यस रोगबाट नेपालमा बर्षेनी ५ वर्षमुनिका हजारौं बालबालिकाहरू अकालमै मर्ने गर्दछन् । समयमै रेखदेख नभई उचित उपचार नपाउनाले निमोनिया हुन गई श्वासप्रश्वास रोगबाट मृत्यु हुनसक्छ ।

साधारण रूघाखोकी लाग्दा

- बच्चाहरूलाई खोकी लाग्ने
- नाकबाट सिंगान बग्ने
- हल्का ज्वरो आउने



निमोनियाका लक्षणहरू

- बच्चाले छिटोछिटो सास फेर्ने
- सास फेर्न गाह्रो हुने
- उच्च ज्वरो आउने
- कोखा हान्ने
- खान पिउन नसक्ने
- सुस्त वा बेहास हुने
- आमाको दूध चुस्न नसक्ने
- सास फेर्दा अस्वाभाविक आवाज सुनिने ।

उपचार

निमोनियाको कारणले हुने मृत्युबाट जोगाउन बच्चालाई रूघाखोकी लाग्दा सामान्य ठानेर कहिल्यै पनि हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन । रूघाखोकीको समयमै घरेलु उपचार गरेमा निमोनिया लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ

घरेलु उपचारहरू निम्न प्रकारका छन्

- बच्चालाई न्यानो पारी राख्ने तर गुम्स्याउनु हुँदैन,
- बच्चालाई आमाको दूध धेरैपटक खुवाइरहनुपर्छ
- सफा कपडा नुनपानीमा चोपेर बच्चाको नाक सफा गरिदिनु पर्छ,
- बच्चालाई खोकी बढी लागेको छ भने घरेलु औषधिहरू जस्तै: मह, अदुवाको रस, तुलसीको पात राखेर उमालेको पानी, बेसार पानी उमालेर खुवाउनु राम्रो हुन्छ ,
- ६ महिनाभन्दा बढी उमेरको बच्चा भएमा अधिपछिभन्दा बढी भोल कुरा र खाने कुरा पटकपटक गरी खुवाउनु पर्छ,
- बच्चाले सास छिटोछिटो फेरेको र कोखा हानेको छ कि भनेर ध्यान दिने

स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि लैजानुपर्ने अवस्थाहरू

- छिटोछिटो (९ मिनेटमा ५० पटकभन्दा बढी) सास फेरेमा ।
- कोखा हानेमा ।